

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-333355

(43) 公開日 平成8年(1996)12月17日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 7 D 277/34			C 0 7 D 277/34	
A 6 1 K 31/425	ADN		A 6 1 K 31/425	ADN
	ADP			ADP
C 0 7 C 67/347			C 0 7 C 67/347	
69/76		9546-4H	69/76	Z
		審査請求	未請求	請求項の数10 F D (全 11 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平7-159782

(22) 出願日 平成7年(1995)6月2日

(71) 出願人 000001395

杏林製薬株式会社

東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地

(72) 発明者 前田 敏夫

栃木県下都賀郡野木町友沼6096

(72) 発明者 野村 昌弘

栃木県下都賀郡野木町友沼6096

(72) 発明者 栗野 勝也

栃木県小山市喜沢352-22

(72) 発明者 木下 進

埼玉県南埼玉郡白岡町新白岡3-10-10

(74) 代理人 弁理士 箕浦 清

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 N-置換ジオキソチアゾリジルベンズアミド誘導体及びその製造法

(57) 【要約】

【目的】 インスリン抵抗性を改善し、強力な血糖低下作用と脂質低下作用を有する新規なN-置換ジオキソチアゾリジルベンズアミド誘導体

アゾリジルベンズアミド誘導体及びそれらの製造法を提供する。

【構成】 一般式(1)




[式中、R¹、R²は同一又は異なって、水素、炭素数1～4の低級アルキル基、炭素数1～3の低級アルコキシ基、炭素数1～3の低級ハロアルキル基、炭素数1～3の低級ハロアルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基、ニトロ基、炭素数1～3の低級アルキル基で置換されても良いアミノ基、及びヘテロ環を、あるいはR¹とR²が

結合しメチレンジオキシ基を、R³は水素、炭素数1～3の低級アルコキシ基、水酸基、ハロゲン原子を、R⁴は水素、炭素数1～4の低級アルキル基を、点線は二重結合又は単結合を、nは0～2の整数を示す]で表されることを特徴とするN-置換ジオキソチアゾリジルベンズアミド誘導体及びそれらの製造法に関する。

【特許請求の範囲】


(2)

【請求項 1】 一般式 (1)



〔式中、 R^1 , R^2 は同一又は異なって、水素、炭素数 1~4 の低級アルキル基、炭素数 1~3 の低級アルコキシ基、炭素数 1~3 の低級ハロアルキル基、炭素数 1~3 の低級ハロアルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基、ニトロ基、炭素数 1~3 の低級アルキル基で置換されても良いアミノ基、及びヘテロ環を、あるいは R^1 と R^2 が結合しメチレンジオキシ基を、 R^3 は水素、炭素数 1~3 の低級アルコキシ基、水酸基、ハロゲン原子を、 R^4 は水素、炭素数 1~4 の低級アルキル基を、点線は二重結合又は単結合を、 n は 0~2 の整数を示す〕で表される N-置換ジオキソチアゾリジルベンズアミド誘導体及びその薬理学的に許容しうる塩。


【請求項 2】 一般式 (2)



〔式中、 R^3 は水素、炭素数 1~3 の低級アルコキシ基、水酸基、ハロゲン原子を、 R^5 は水素、炭素数 1~3 の低級アルキル基を示す〕で表される化合物に式




で表される化合物を作用させることを特徴とする一般式



〔式中、 R^3 , R^5 は前述の通り〕で表される化合物の製造法。


【請求項 3】 一般式 (4)



〔式中、 R^3 は水素、炭素数 1~3 の低級アルコキシ基、水酸基、ハロゲン原子を、 R^5 は水素、炭素数 1~3 の低級アルキル基を示す〕で表される化合物を還元することを特徴とする一般式 (5)


*

10




* 〔式中、 R^3 , R^5 は前述の通り〕で表される化合物の製造法。

【請求項 4】 一般式 (6)




20 〔式中、 R^3 は水素、炭素数 1~3 の低級アルコキシ基、水酸基、ハロゲン原子を示し、 R^6 は炭素数 1~3 の低級アルキル基を、点線は二重結合又は単結合を示す〕で表される化合物を加水分解することを特徴とする一般式 (7)



30 〔式中、 R^3 、点線は前述の通り〕で表される化合物の製造法。

【請求項 5】 一般式 (8)




〔式中、 R^3 は水素、炭素数 1~3 の低級アルコキシ基、水酸基、ハロゲン原子を、 R^6 は炭素数 1~3 の低級アルキル基を示す〕で表される化合物をハロゲン化水素の存在下にジアゾニウム塩とした後に一般式 (9)

40




〔式中、 R^7 は炭素数 1~3 の低級アルキル基を示す〕で表される化合物を作用させることを特徴とする一般式




50 〔式中、 R^3 , R^6 , R^7 は前述の通りであり、X はハ

ロゲン原子を示す]で表される化合物の製造法。

【請求項 6】 一般式 (10)




[式中、R³ は水素、炭素数 1～3 の低級アルコキシ基、水酸基、ハロゲン原子を、R⁶ は炭素数 1～3 の低級アルキル基を、R⁷ は炭素数 1～3 の低級アルキル基を示し、X はハロゲン原子を示す]で表される化合物にチオ尿素を作用させた後、加水分解することの特徴とする一般式 (7a)



[式中、R³ は前述の通り]で表される化合物の製造法。

【請求項 7】 一般式 (7)




* 20

[式中、R¹, R², R³, R⁴、点線、n は前述の通り]で表される N-置換ジオキソチアゾリジルベンズアミド誘導体の製造法。


※ミド誘導体の製造法。

【請求項 8】 一般式 (1a)



[式中、R¹, R² は同一又は異なって、水素、炭素数 1～4 の低級アルキル基、炭素数 1～3 の低級アルコキシ基、炭素数 1～3 の低級ハロアルキル基、炭素数 1～3 の低級ハロアルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基、ニトロ基、炭素数 1～3 の低級アルキル基で置換されても良いアミノ基、及びヘテロ環を、あるいは R¹ と R² が


★結合しメチレンジオキシ基を、R³ は水素、炭素数 1～3 の低級アルコキシ基、水酸基、ハロゲン原子を、R⁴ は水素、炭素数 1～4 の低級アルキル基を、n は 0～2 の整数を示す]を還元することの特徴とする一般式 (1b)



[式中、R¹, R², R³, R⁴、n は前述の通り]で表される N-置換ジオキソチアゾリジルベンズアミド誘導体の製造法。


【請求項 9】 一般式 (1c)

50



[式中、 R^1 , R^2 は同一又は異なって、水素、炭素数1～4の低級アルキル基、炭素数1～3の低級アルコキシ基、炭素数1～3の低級ハロアルキル基、炭素数1～3の低級ハロアルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基、ニトロ基、炭素数1～3の低級アルキル基で置換されても*10


* 良いアミノ基、及びヘテロ環を、あるいは R^1 と R^2 が結合しメチレンジオキシ基を、 R^4 は水素、炭素数1～4の低級アルキル基を、点線は二重結合又は単結合を、 n は0～2の整数を示す]で表される化合物にルイス酸を作用させることを特徴とする一般式(1d)



[式中、 R^1 , R^2 , R^4 , 点線、 n は前述の通り]で表されるN-置換ジオキソチアゾリジルベンズアミド誘導体※

※ 導体の製造法。

【請求項10】 一般式(1)



[式中、 R^1 , R^2 は同一又は異なって、水素、炭素数1～4の低級アルキル基、炭素数1～3の低級アルコキシ基、炭素数1～3の低級ハロアルキル基、炭素数1～3の低級ハロアルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基、ニトロ基、炭素数1～3の低級アルキル基で置換されても良いアミノ基、及びヘテロ環を、あるいは R^1 と R^2 が結合しメチレンジオキシ基を、 R^3 は水素、炭素数1～3の低級アルコキシ基、水酸基、ハロゲン原子を、 R^4 は水素、炭素数1～4の低級アルキル基を、点線は二重結合又は単結合を、 n は0～2の整数を示す]で表されるN-置換ジオキソチアゾリジルベンズアミド誘導体及びその薬理学的に許容しうる塩の少なくとも1種類以上を有効成分とする血糖降下薬。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、糖尿病及び高脂血症を改善する新規なN-置換ジオキソチアゾリジルベンズアミド誘導体及びそれらの製造法に関する。

【0002】

【従来の技術】従来より経口糖尿病治療薬としては、ピグアナイド系及びスルホニルウレア系化合物が用いられている。しかしながらピグアナイド系化合物では、乳酸アルドーシスあるいは低血糖を、スルホニルウレア系化合物では重篤かつ遅延性の低血糖を引き起こし、その副★

★作用が問題となっており、このような欠点のない新しい糖尿病治療剤の出現が望まれている。またチアゾリジン-2, 4-ジオン誘導体のあるものが血糖低下及び血中脂質低下作用を示すことが知られているが(Journal of Medicinal Chemistry, 第35巻.P.1853 (1992), 特開平1-272573号公報)、これらの化合物はいずれも、チアゾリジン-2, 4-ジオン環と芳香環を結ぶ中間のベンゼン環の置換位置がパラ位であり、前者は芳香環がオキサゾール環であり、後者は結合がスルホンアミドである等、本発明化合物であるN-置換ジオキソチアゾリジルベンズアミド誘導体とは構造的に異なるものである。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】糖尿病患者の大多数を占めるインスリン非依存型糖尿病(NIDDM)においてはインスリン抵抗性を改善し、安全性の高い有効な血糖低下薬が強く望まれる。


【0004】

40 【課題を解決するための手段】本発明者らは、インスリン抵抗性を改善し、強力な血糖低下作用を有する安全性の高い薬物に関して鋭意研究を重ねた結果、下記一般式(1)で表される新規N-置換ジオキソチアゾリジルベンズアミド誘導体が優れた血糖低下作用、脂質低下作用を有することを見出し本発明を完成した。


【0005】即ち本発明は一般式(1)

*c1ccc(cc1)CNC(=O)c2ccc(cc2)C[C@H]3C(=O)NC(=O)S3*c1ccc(cc1CNC*)C(*)O=C1NC(=O)S[C@H]1C2=CC=C(C(=O)O)C=C2R3

る。



[式中、 R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , n は前述の通り]




[式中、 R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , n は前述の通り]


【0018】反応は有機溶媒、例えばエタノール、酢酸エチル、N, N-ジメチルホルムアミド等中、あるいはそれらの混合溶媒中で、室温～加熱下、パラジウム/炭素等の触媒の存在下に常圧～4 kg/cm²で水素添加することにより行うことができる。あるいは有機溶媒、例え*

*ばエタノール等のアルコール中、又は水との混合溶媒中で、室温～加熱下にナトリウムアマルガムと処理することにより行うことができる。

【0019】下記一般式(1d)である化合物は一般式(1c)にルイス酸を作用させることにより製造することができる。




[式中、 R^1 , R^2 , R^4 、点線、 n は前述の通り]



[式中、 R^1 , R^2 , R^4 、点線、 n は前述通り]

【0020】反応は有機溶媒、例えばジクロロメタン、クロロホルム等中、-78℃～室温下でルイス酸、例えば三臭化ホウ素、三塩化ホウ素等で処理することにより行うことができる。


【0021】一般式(7)である化合物は下記一般式(6)の化合物を加水分解することにより製造できる。



[式中、 R^3 、点線は前述の通りであり、 R^6 は炭素数1～3の低級アルキル基を示す]

【0022】反応は酸性、又はアルカリ性条件下で反応温度としては冷却下～溶媒還流で行うことができ、酢酸と濃塩酸の混合溶媒中で加熱還流することが好ましい。

【0023】一般式(4)である化合物は下記一般式(2)の化合物に式(3)の化合物を作用させることにより製造できる。



※ [式中、 R^3 は前述の通りであり、 R^5 は水素、炭素数1～3の低級アルキル基を示す]




[式中、 R^1 及び R^5 は前述の通り]



【0024】反応は有機溶媒、例えばベンゼン、トルエン、キシレン等中で、反応温度としては室温～溶媒還流温度で行うことができるが、溶媒還流温度が好ましい。また触媒として、二級アミン(ピペリジン等)あるいは酢酸塩類(酢酸アンモニウム等)と酢酸の添加も好適である。また無溶媒で塩基(酢酸ナトリウム、ピペリジン

等)と共に加熱することによっても行うことができる。


【0025】一般式(5)である化合物は、一般式(4)の化合物を還元することにより製造することができる。




[式中、R³、R⁶は前述の通り]

【0026】反応は有機溶媒、例えばエタノール、酢酸エチル、N、N-ジメチルホルムアミド等中、あるいはそれらの混合溶媒中で、室温～加熱下、パラジウム/炭素等の触媒の存在下に常圧～4 kg/cm²で水素添加することにより行うことができる。あるいは有機溶媒、例えばエタノール等のアルコール中、又は水との混合溶媒中で、室温～加熱下にナトリウムアマルガムと処理することにより行うことができる。

【0027】一般式(7a)である化合物は下記一般式(10)の化合物にチオ尿素を作用させた後、加水分解することによっても製造できる。




[式中、R³は前述の通り]



[式中、R³、R⁶は前述の通りであり、R⁷は炭素数1～3の低級アルキル基を、Xはハロゲン原子を示す]


【0028】一般式(10)の化合物とチオ尿素との反応は有機溶媒、例えばエタノール等のアルコール中で室温～溶媒還流温度で行うことができるが、溶媒還流温度が好ましい。必要ならば塩基(酢酸ナトリウム等)を添加しても良い。次の反応である加水分解は酸性条件下で行うことができ、塩酸あるいは塩酸と有機溶媒(スルホラン等)の混合溶媒中で加熱還流することが好ましい。

【0029】一般式(10)である化合物は一般式(8)の化合物をジアゾニウム塩とした後に一般式(9)の化合物とメイルバイン アリレーション(meerwein Arylation)を行うことにより製造できる。



[式中、R³、R⁶は前述の通り]

(7)



[式中、R⁷は前述の通り]

【0030】反応は有機溶媒、例えばメタノール、エタノール等のアルコール類もしくはアセトン、メチルエチルケトン等のケトン類、水及びこれにの混合溶媒中、塩酸、臭化水素酸等のハロゲン化水素存在下、一般式

(8)である化合物を亜硝酸ナトリウム等の亜硝酸塩類によりジアゾ化した後、一般式(9)である化合物の存在下に触媒量の酸化第一銅、塩化第一銅等の第一銅塩類を作用させることにより行うことができる。

【0031】

【実施例】次に本発明を具体例によって説明するがこれらの例によって本発明が限定されるものではない。実施例で使用する略号は以下の意味を表す。

¹H NMR プロトン核磁気共鳴スペクトル
MS 質量スペクトル

CDCI₃ 重水素化クロロホルム

DMF N、N-ジメチルホルムアミド

DMSO ジメチルスルホキシド

d₆-DMSO 重水素化ジメチルスルホキシド

【0032】実施例1

5-(2,4-ジオキソチアゾリジン-5-イリデン)メチルー2-メトキシ安息香酸メチル

【0033】5-ホルミルー2-メトキシ安息香酸メチル(490mg)、チアゾリジン-2,4-ジオン(358mg)、酢酸アンモニウム(401mg)、酢酸(0.8ml)、ベンゼン(10ml)の混合物をディーンスターク脱水装置を付して4時間加熱還流した。冷後、析出した結晶を濾取し、ベンゼン、20%アセトン水溶液で洗浄した後、乾燥し、目的化合物を結晶として634mg(86%)得た。

【0034】¹H NMR (d₆-DMSO)、δ: 3.83(3H, s), 3.90(3H, s), 7.34(1H, d, J=9.3Hz), 7.79(1H, s), 7.76-7.83(1H, m), 7.87-7.92(1H, m), 12.59(1H, s)

【0035】実施例2

5-(2,4-ジオキソチアゾリジン-5-イリデン)メチルー2-メトキシ安息香酸

【0036】5-(2,4-ジオキソチアゾリジン-5-イリデン)メチルー2-メトキシ安息香酸メチル(629mg)の酢酸-濃塩酸(1:1, 18.0ml)懸濁液を6時間加熱還流した。冷後、水(36ml)を加え、結晶を濾取し、水洗後、乾燥し、目的化合物を結晶として599mg(100%)得た。

【0037】¹H NMR (d₆-DMSO)、δ: 3.89(3H, s), 7.31(1H, d, J=8.8Hz), 7.76(1H, dd, J=2.4, 8.8Hz), 7.79(1H, s), 7.89(1H, d, J=2.4Hz), 12.58(1H, s), 12.91(1H, br)

【0038】実施例3

5-(2, 4-ジオキソチアゾリジン-5-イル)メチル-2-メトキシ安息香酸メチル

【0039】5-(2, 4-ジオキソチアゾリジン-5-イルイデン)メチル-2-メトキシ安息香酸メチル (9.52g) をDMF (250ml) に懸濁し、室温、3.5kg/cm² に水素加圧下10%パラジウム/炭素 (10.0g) で水素化した。反応後、溶液を濾過、濃縮し、残留物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗い、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (展開溶媒 塩化メチレン:アセトン=50:1) で精製し、目的化合物をアモルファスとして5.88g (61%) 得た。MS (m/z): 295 (M⁺)

【0040】実施例4

5-(2, 4-ジオキソチアゾリジン-5-イル)メチル-2-メトキシ安息香酸

【0041】5-(2, 4-ジオキソチアゾリジン-5-イル)メチル-2-メトキシ安息香酸メチル (6.39g) のメタノール (120ml) 懸濁液に水酸化ナトリウム水溶液 (水酸化ナトリウム 5.47g, 水 30ml) を加え、60℃に加熱し1時間攪拌した。冷後、水 (100ml) を加え、酢酸エチルで洗浄した後、水層を2N塩酸で酸性とし酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水の順で洗い、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下濃縮し析出した結晶を濾取し、目的化合物を結晶として3.93g (65%) 得た。融点: 182.0~184.0℃

【0042】実施例5

3-(2, 4-ジオキソチアゾリジン-5-イルイデン)メチル安息香酸

【0043】3-ホルミル-2-メトキシ安息香酸メチル (1.90g)、チアゾリジン-2, 4-ジオン (2.48g)、酢酸アンモニウム (1.84g)、酢酸 (3.70ml)、ベンゼン (60ml) の混合物をディーンスターク脱水装置を付して6時間加熱還流した。冷後、析出した結晶を濾*

* 取し水洗した後、この結晶を酢酸-濃塩酸 (1:1, 60ml) に懸濁し、6時間加熱還流した。冷後、水 (150ml) を加え、結晶を濾取し、水洗後、乾燥し、目的化合物を結晶として2.38g (82%) 得た。

MS (m/z): 249 (M⁺)

【0044】実施例6

N-(4-t-ブチルフェニル)-5-(2, 4-ジオキソチアゾリジン-5-イルイデン)メチル-2-メトキシベンズアミド

【0045】5-(2, 4-ジオキソチアゾリジン-5-イルイデン)メチル-2-メトキシ安息香酸 (1.00g)、4-t-ブチルアニリン (540mg) のDMF (10ml) 溶液にアルゴン雰囲気、室温攪拌下シアノリン酸ジエチル (615mg)、トリエチルアミン (370mg) を加え、そのまま8時間攪拌した。反応液を氷水に注ぎ、析出する結晶を濾取し、水洗後乾燥し目的化合物を結晶として1.45g (99%) 得た。更にこのものをエタノールから再結晶し、黄色プリズム晶として精製した目的化合物を得た。融点 261.0~265.0℃

【0046】

元素分析値 (%): C₂₂H₂₂N₂O₄S として


	C	H	N
計算値	64.37	5.40	6.82
実測値	64.55	5.45	6.92

【0047】実施例7~15

実施例6と同様にして表1の化合物を得た。

【0048】

【表1】



実施例	R ¹ , R ²	R ³	R ⁴	n	点融部分	融点 (°C) (再結晶溶解)	組成式	元素分析値 (%) 計算値/実測値 C H N
7	4-CF ₃	6-MeO	H	2	単結合	153.0~154.0 (酢酸エチル-ヘキサン)	C ₂₁ H ₁₉ F ₃ N ₂ O ₄ S · 1/4H ₂ O	55.14 4.23 6.19 55.55 4.12 6.11
8	4-CF ₃	6-MeO	H	2	二重結合	207.0~209.0 (エタノール)	C ₂₄ H ₁₇ F ₃ N ₂ O ₄ S	55.88 3.81 6.22 55.91 3.78 6.14
9	4-CF ₃	6-MeO	Et	1	二重結合	122.0~124.0 (エタノール)	C ₂₂ H ₁₉ F ₃ N ₂ O ₄ S · 1/4H ₂ O	56.34 4.20 5.97 56.18 4.29 6.05
10	H	6-MeO	Me	1	二重結合	94.0~99.0 (カラム精製)	C ₂₀ H ₁₈ N ₂ O ₄ S	—
11	4-CF ₃	H	H	1	二重結合	217.0~218.0 (メタノール)	C ₁₉ H ₁₃ F ₃ N ₂ O ₄ S	56.16 3.22 6.89 56.12 3.11 6.78
12	4-CF ₃	6-MeO	H	0	二重結合	254.5~256.0 (エタノール)	C ₁₉ H ₁₃ F ₃ N ₂ O ₄ S	High MS 422.0548 422.0546
13	2, 4-Cl	6-MeO	H	0	二重結合	208.0~209.0 (DMSO-H ₂ O)	C ₁₈ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₄ S	51.00 1.85 6.62 50.97 1.82 6.60
14	4-t-Bu	6-MeO	Me	0	二重結合	249.0~250.0 (メタノール)	C ₂₃ H ₂₁ N ₂ O ₄ S	65.91 5.79 6.60 64.94 5.73 6.62
15	4-t-Bu	H	H	0	二重結合	270.0~275.0 (エタノール)	C ₂₄ H ₂₁ N ₂ O ₄ S	66.30 5.30 1.36 66.18 5.30 1.42

【0049】実施例16

N-(4-t-ブチルフェニル)-5-(2, 4-ジオキソチアゾリジン-5-イル)メチル-2-メトキシベンズアミド

【0050】N-(4-t-ブチルフェニル)-5-(2, 4-ジオキソチアゾリジン-5-イリデン)メチル-2-メトキシベンズアミド (900mg) をエタノール-酢酸エチル (1:1, 45ml) に懸濁し、室温、3.0kg/cm² に水素加圧下10%パラジウム/炭素で水素化した。反応液を濾過、濃縮し残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (展開溶媒 塩化メチレン:メタノール=50:1) で精製し、目的化合物を結晶として 709mg (78%) 得た。更にこのものを酢酸エチルから再結晶し、無色プリズム晶として精製した目的化合物を得た。融点 217.5~219.0 °C

【0051】

元素分析値 (%) : C₂₂H₂₄N₂O₄S として

	C	H	N
計算値	64.06	5.86	6.79
実測値	64.34	5.76	6.78


*

【0052】実施例17~22

実施例16と同様にして表2の化合物を得た。

【0053】

【表2】



*

実施例	R ¹ , R ²	R ³	R ⁴	n	融点 (°C) (再結晶溶解)	組成式	元素分析値 (%) 計算値/実測値 C H N
17	4-CF ₃	6-MeO	Et	1	アモルファス	C ₂₂ H ₂₂ F ₃ N ₂ O ₄ S · 1/4H ₂ O	55.10 4.01 5.95 55.22 4.19 5.74
18	H	6-MeO	Me	1	アモルファス	C ₂₀ H ₁₈ N ₂ O ₄ S · 1/4H ₂ O	61.05 3.88 7.13 61.79 3.40 7.21
19	4-CF ₃	H	H	1	166.5~167.6 (酢酸エチル-ヘキサン)	C ₁₉ H ₁₅ F ₃ N ₂ O ₄ S	51.88 1.70 6.88 51.93 1.62 6.83
20	4-CF ₃	6-MeO	H	0	217.5~218.5 (エタノール)	C ₁₉ H ₁₅ F ₃ N ₂ O ₄ S	51.77 1.64 6.80 51.55 1.63 6.61
21	4-t-Bu	6-MeO	Me	0	166.5~168.5 (酢酸エチル-ヘキサン)	C ₂₃ H ₂₆ N ₂ O ₄ S	61.77 1.14 6.93 61.66 1.21 6.61
22	4-t-Bu	H	H	0	166.0~166.5 (エタノール-ヘキサン)	C ₂₁ H ₂₁ N ₂ O ₄ S	65.95 5.80 7.31 65.91 5.77 7.21

【0054】実施例23

N-(4-t-ブチルフェニル)-5-(2, 4-ジオ

キソチアゾリジン-5-イル) メチル-2-ヒドロキシ
ベンズアミド

【0055】N-(4-*t*-ブチルフェニル)-5-(
2,4-ジオキソチアゾリジン-5-イル)メチル-
2-メトキシベンズアミド(404mg)の無水塩化メチレン
(12ml)懸濁液にアルゴン雰囲気、ドライアイス-アセ
トン冷却撹拌下、1.0N三臭化ホウ素-塩化メチレン溶
液(0.12ml)をゆっくり滴下した。室温で5時間撹拌し
た後、3時間放置した。反応液に水を加え、塩化メチ
レン-メタノール(10:1)で抽出した。有機層を飽和食
塩水で洗い、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧
下濃縮した。残留物に塩化メチレン-ジイソプロピルエ
ーテルを加え結晶を濾取、塩化メチレン-ジイソプロピ
ルエーテル(1:1)で洗浄した後、乾燥し、目的化合
物を結晶として154mg(39%)得た。融点238.0~241.
0℃

*【0056】

元素分析値(%) : C₂₁H₂₁N₂O₄Sとして

	C	H	N
計算値	63.30	5.56	7.03
実測値	63.13	5.60	7.28

【0057】試験例1

遺伝性肥満マウス(C57BL ob/ob)を用い、
試験前に尾静脈より採血して血糖値を測定した。血糖値
に差がないように群分けし、実施例17、18及び19の化合
物を10mg/kgの用量で5日間経口投与した。耐糖能試験
は一晩絶食した後、グルコースの2g/kgを経口投与
し、0分、30分及び60分の血糖値を測定し。血糖低下率
は下記式より求めた。

【0058】

血糖低下率(%) =

$$\frac{[(\text{ビヒクル対照群のグルコース投与0分、11分及び11分の血糖値の総和}) - (\text{各群のグルコース投与0分、11分及び11分の血糖値の総和})]}{(\text{ビヒクル対照群のグルコース投与0分、11分及び11分の血糖値の総和})} \times 100$$

【0059】結果を表3に示す。これらの結果より、本
発明化合物は強力な血糖低下作用を有することが示され
た。

【0060】

【表3】

化 合 物	用 量 (mg/kg)	血糖低下率 (%)
実施例17	10	31
実施例18	10	21
実施例19	10	25

【手続補正書】

【提出日】平成8年5月16日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0043

【補正方法】変更

【補正内容】

【0043】3-ホルミル安息香酸メチル(1.90g)、
チアゾリジン-2,4-ジオン(2.48g)、
酢酸アンモニウム(1.84g)、酢酸(3.70m
l)、ベンゼン(60ml)の混合物をディーンスター 50

ク脱水装置を付して6時間加熱還流した。冷後、析出
した結晶を濾取し水洗した後、この結晶を酢酸-濃塩酸
(1:1, 60ml)に懸濁し、6時間加熱還流した。
冷後、水(150ml)を加え、結晶を濾取し、水洗
後、乾燥し、目的化合物を結晶として2.38g(82
%)得た。

MS(m/z): 249(M⁺)

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0050

【補正方法】変更

【補正内容】

【0050】N-(4-*t*-ブチルフェニル)-5-(2,4-ジオキソチアゾリジン-5-イリデン)メチル-2-メトキシベンズアミド(900mg)をエタノール-酢酸エチル(1:1, 45ml)に懸濁し、室温、3.0kg/cm²に水素加圧下10%パラジウム

／炭素(900mg)で水素化した。反応液を濾過、濃縮し残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒 塩化メチレン:メタノール=50:1)で精製し、目的化合物を結晶として709mg(78%)得た。更にこのものを酢酸エチルから再結晶し、無色プリズム晶として精製した目的化合物を得た。融点217.5~219.0℃

フロントページの続き

(51)Int. Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

C 0 7 C 69/84

C 0 7 C 69/84

69/92

69/92

C 0 7 D 417/12

3 1 7

C 0 7 D 417/12

3 1 7

(72)発明者 佐藤 浩也

栃木県下都賀郡野木町友沼4660-4

(72)発明者 村上 浩二

栃木県下都賀郡野木町丸林386-2 プレ
シーン野木ハイランズ704

(72)発明者 角田 雅樹

栃木県下都賀郡野木町友沼5932



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **08333355 A**(43) Date of publication of application: **17 . 12 . 96**

(51) Int. Cl.

C07D277/34
A61K 31/425
A61K 31/425
C07C 67/347
C07C 69/76
C07C 69/84
C07C 69/92
C07D417/12

(21) Application number: **07159782**(22) Date of filing: **02 . 06 . 95**(71) Applicant: **KYORIN PHARMACEUT CO LTD**

(72) Inventor:
MAEDA TOSHIO
NOMURA MASAHIRO
AWANO KATSUYA
KINOSHITA SUSUMU
SATO HIROYA
MURAKAMI KOJI
TSUNODA MASAKI


**(54) N-SUBSTITUTED
 DIOXOTHIAZOLIDIYLBENZAMIDE DERIVATIVE
 AND ITS PRODUCTION**

COPYRIGHT: (C)1996,JPO


(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject new compound having improved insulin resistance, strongly hypoglycemic action and hypolipidemic action, being safe, useful as a therapeutic agent for diabetes and hyperlipemia.


CONSTITUTION: This N-substituted dioxothiazolidiylbenzamide derivative is shown by formula I (R^1 and R^2 are H, a 1-4C lower alkyl, a 1-3C lower alkoxy, a 1-3C lower haloalkyl, a halogen, a hydroxyl group, etc.; R^3 is H, a 1-3C lower alkoxy, a hydroxyl group or a halogen; R^4 is H or a 1-4C lower alkyl; a dotted line is a double bond or a single bond; (n) is an integer of 0-2) and its pharmacologically permissible salt such as methyl 5-(2,4-dioxothiazolidin-5-ylidene)methyl-2-methoxybenzoate. The compound of formula I, for example, is obtained by treating a compound of formula II with a compound of formula III. The reaction can be carried out by treatment with a condensation agent in an organic solvent and the reaction temperature is preferably cooling with ice to a room temperature.



I



II



III